

## ニトログリセリン(耐絞寧)舌下錠の使用指導書

1. 本薬は舌の下に含んで自然に溶かして吸収させるタイプです、飲み込んではいけません。めまいや転倒の恐れがあるため、使用の際は座って行ってください。
2. 胸の痛みが突然発生した場合は、直ちに活動を停止し、速やかにニトログリセリンを1錠舌の下に含んで溶かし、吸収させてください(使用後には頭痛が発生することがあります)。胸痛の症状が改善しない場合は、5分間隔でさらにもう1錠使用することができます。しかし、15分間以内で3錠を使用しても痛みが続く場合は、直ちに医療機関を受診してください。
3. 瓶に表示されている有効期限は、ニトログリセリン(Nitrostat®)が室温(20~25°C)で保存されている未開封状態の期限を意味します。瓶を開封した場合は、有効期限は6ヶ月です。初めて開封する際は、開封日を瓶の蓋に記入することをお勧めします。
4. 光を避けるために、元の茶色の瓶に入れて保管してください。外出時は必ず携帯してください。乾燥した室温の環境に保管し、瓶の蓋をしっかり閉めてください。
5. この薬を服用すると、一時的なめまいや起立性低血圧が起こることがあります。他の血管拡張剤(例: バイアグラ、シアリス、レビトラ)や降圧剤を服用している場合は、医師に報告する必要があります。過度な降圧効果を避けてください。アルコール性の飲料との併用は避けてください。



台安医院薬品外観識別ウェブサイト