

骨密妥発泡錠の使用指導書

調製方法

1. 骨密妥発泡錠を少なくとも 120 ミリリットルの常温水に溶かして下さい。
2. 発泡が止まったら、さらに 5 分間待ち、薬液を約 10 秒間かき混ぜた後に服用して下さい。

注意事項

1. 骨密妥発泡錠を直接飲み込んだり、咀嚼したり、吸い込まないで下さい。口腔や喉の潰瘍を防ぐためです。
2. 骨密妥発泡錠は、朝起きた後の空腹時に服用し、食物、飲み物、他の薬とは少なくとも 30 分の間隔を空けてください。
3. 骨密妥発泡錠を使用した後は、少なくとも 30 分間は上半身を直立に保ち、その日の最初の食事まで横になることを控えて下さい。
4. 毎週決まった時間に薬を服用してください。お薬の飲み忘れに気づいたときは「すぐに」飲んでください。ただし、次の服用までに 1 週間の間隔を空けてください。2 倍の量を一度に服用しないでください。
5. 薬を服用している間は良好な口腔衛生を維持し、定期的に歯科のフォローアップを行ってください。歯科の侵襲的な治療が必要な場合は、歯科医にビスホスホネート薬を使用していることを伝えてください。



台安医院薬品外観識別ウェブサイト