

如何預防C型肝炎感染？

- 目前無C型肝炎疫苗可供接種，應採取預防措施以避免感染：
- 1. 正確全程使用保險套，不從事無保護的性行為。
- 2. 不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板。
- 3. 使用拋棄式注射針具及針灸針具，避免不必要的輸血、打針、針灸等行為。
- 4. 穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，避免不必要的刺青、穿耳洞等行為。
- 具有C型肝炎感染風險的族群，建議定期接受B、C型肝炎篩檢，以早期發現及早期治療。



請勿共用



健康叮嚀

- 近年來國內外發現透過性行為傳播C型肝炎有增加的趨勢，主要發生於男男間性行為，可能因性行為造成肛門黏膜傷害或性病形成的潰瘍病灶，致增加感染的風險。建議正確全程使用保險套，不從事無保護的性行為。
- 如有C型肝炎感染風險，請定期篩檢，以早期發現及早期治療。
- 若不慎感染C型肝炎，建議同時進行性病篩檢，包括愛滋病篩檢。
- 民眾對急性病毒性C型肝炎防治如有相關疑義，聯絡所在地衛生局/所或撥打免付費電話：**1922**。



疫情通報及諮詢專線：**1922** 廣告



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人 
www.facebook.com/TWCDC

防治急性C型肝炎

預防急性C肝，落實安全性行為，遵守預防準則



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC