

潛伏結核篩檢的重要

為達到世界衛生組織（WHO）2035 年「終止全球結核病的流行」的目標，疾管署今年持續推動潛伏結核感染治療，為降低潛伏結核感染者（LTBI）因發病造成疫情傳播的風險，擴大免費潛伏結核感染診斷及治療服務對象，希望達到「不傳染、早篩檢、全治療、除結核」的終極目標。

「潛伏站出來 齊心終結核」完成潛伏結核治療，擔心日後發病後恐傳染給家人朋友同事，應趁早於不具傳染力之潛伏期時接受治療，有效降低未來發病的機率。早期發現治療，可免於結核病的傳染威脅。

希望潛伏結核感染者早期檢驗、早期治療，以降低日後發病風險，治療對象為只要曾為高傳染性結核病個案之接觸者，皆可主動洽各地縣市衛生局所，或接到衛生局所主動通知，積極接受檢測是否感染及治療，可預期防止發病，並避免社區傳播。

疾管署統計，每 1 名結核病患者之接觸人數約 10 人，接觸者若遭受感染成為潛伏結核感染者（LTBI），終生有 10% 的機會進展為結核病，因此呼籲曾為高傳染性結核病個案之接觸者，踴躍接受潛伏結核感染篩檢與治療，加速達成消除結核之終極目標。

若有任何相關的問題，請直接詢問照顧您的護理人員，我們將竭誠為您服務

敬祝 身體健康、平安喜樂!

修訂日期:20191001