

肺結核藥物副作用

皮膚過敏：

- 1.結核藥物引起的皮膚過敏反應變異性也很大，從最輕微的搔抓到最嚴重的（機率極低）都有可能。但皮膚過敏也是造成病患不能規則服藥的主要原因之一，必須妥為處理。
- 2.輕微的皮膚過敏可以先試用抗組織胺、外用類固醇藥膏以緩解其症狀，但必須提醒病患抗組織胺的相關副作用。
- 3.所有的結核藥物都可以造成皮膚過敏等情形，因此在發生皮膚過敏時，必須經過臨床試藥的程序，才能斷定是哪一種藥物引起。

建議

保持身體清潔

選擇棉質透氣衣服

剪短指夾並磨平

以按壓拍打皮膚癢處

以冷毛巾冷敷患處止癢

擦乳液保濕改善乾癢情況

戴帽或撐傘以防曬

視力、辨色力影響：

使用 EMB 病人，應按月檢查視力及按週檢查辨色力

建議

視需要至少應按月檢查視力及辨色力

B、C 型肝炎、愛滋病或腎功能、糖尿病追蹤：

建議

返診頻率和血液生化檢查應更密集。

驗痰：

建議

初查：需檢驗 3 套，第 2、5 及完治時各驗 2 套痰

痰陽：每月驗 2 套痰(塗片+培養)至陰轉為止

胸部 X 光片：

建議

每 3 個月檢查 1 次

接觸者檢查：

建議

1 個月內應完成胸部 X 光檢查

若有需要

- * 可皮膚結核菌素測試
- * 丙型干擾素釋放血液試驗
- * 安排痰液檢查

若有任何相關的問題，請直接詢問照顧您的護理人員，我們將竭誠為您服務

敬祝 身體健康、平安喜樂！

修訂日期 20170820

[Tel:02-27718151 # 2662](tel:02-27718151#2662)