

化學治療副作用注意事項

化學治療前人工血管的照護

在接受針劑化學藥物治療前，醫師會在病人身上先行手術植入一條**人工血管**，作為日後多次治療時注射用，主要在避免病患因化療藥物的毒性影響傷害周邊靜脈血管和附近皮膚組織及長期重複受靜脈穿刺之不適。

人工血管底座通常會放置在鎖骨下方埋入皮膚固定，其導管則會沿著大血管到達心臟，注射底座外觀像一般硬幣大小凸起，每次治療會以專用角針從底座置入；須注意放置人工血管的當側手臂勿過度用力活動拉扯，手術後傷口保持清潔乾燥，當傷口癒合時，便可正常活動洗澡不影響日常生活。當化療療程結束後仍會繼續放置，約需 1~3 個月回診沖洗管路以保持通暢，化療完成約 2~3 年經醫師追蹤評估穩定時便可考慮移除。

如果有下列不適，需與醫護人員聯絡：

- 人工血管傷口處變紅腫，疼痛、出血等情形。
- 2 隻手臂顏色溫度不同。
- 發燒不適。
- 注射過程中疑似有液體滲漏。
- 注射部位覺得腫脹不適
- 感到呼吸困難或眩暈。
- 突然的胸痛、深吸一口氣或咳嗽時有不適感。