

## 抗生素藥品使用須知

### ★作用：

抗生素是一種可抑制細菌生長或殺死細菌的藥物，用於治療微生物感染的疾病。

### ★用法：請依醫師指示服用。

### ★注意事項：

- (1) 有些抗生素會與鈣片、牛奶、胃藥產生交互作用，或受到食物影響而干擾抗生素的吸收，故需空腹使用。若抗生素需空腹服用，空腹服用時間為飯前一小時或飯後二小時。
- (2) 抗生素的使用有一定的療程，不可因為症狀已經消失或緩解就自行停藥、減量或不規則服藥，請依照醫師指示用藥，完成整個服藥療程，若中斷療程可能會復發或造成抗藥性菌種之產生。
- (3) 如果您有藥物過敏，肝病，腎臟病等病史，請先告知醫師。
- (4) 抗生素懸液粉劑請依醫師或藥師指示配製後再行服用。
- (5) 懷孕：懷孕或計畫懷孕，請先告知醫師。
- (6) 哺乳：哺乳者請先告知醫師。

### ★副作用：

過敏反應(如皮膚紅疹，瘙癢或蕁麻疹，臉、嘴唇腫大)。腹瀉、頭痛、胃痛、腹脹、疲倦、噁心或嘔吐等。

### ★忘記服藥該怎麼辦？

儘可能在您想起時，立刻補服一個劑量；但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

### ★保存方法：

藥品需置於室溫(低於 25°C)的乾燥、避光處；稀釋後之抗生素懸液依藥袋指示儲存(需冷藏或室溫)，稀釋後之保存期限為 5~7 天，並請置在孩童不可取得之處。

臺安醫院藥劑科 關心您