

癲能停膠囊 用藥指導單

- 成分名：Phenytoin
- 作用：此藥可用於預防及治療癲癇，治療偏頭痛和三叉神經痛。
- 用法：請依照醫囑指示服用。
- 副作用：過敏反應（如皮膚紅疹，瘙癢或蕁麻疹，臉、嘴唇腫大）。感覺頭昏眼花，嗜睡，視力模糊，困惑，疲倦，情緒上的變化，言語不清，或意識混亂。噁心或嘔吐，便秘，牙齦增生。
- 注意事項：
 1. 如果您對 phenytoin 過敏請先告知醫師。
 2. 如果您有糖尿病，肝病，腎臟病，心臟病，精神疾病等病史，請先告知醫師。
 3. 請避免飲用酒精性飲料。
 4. 此藥可能會降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。
 5. 此藥可能會有暈眩的副作用，所以在未確定藥物對您有任何的影響之前，應避免駕車或其他危險性的工作或活動。
 6. 服藥期間，請小心照護您的牙齒健康，並且定期看牙醫。
 7. 懷孕：懷孕或計畫懷孕，請先告知醫師。
 8. 哺乳：哺乳者請先告知醫師。
- 忘記服藥該怎麼辦？

儘可能在您想起時，立刻補服一個劑量；但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。
- 保存方法：請儲存於室溫 20-25°C 的乾燥、避光，且兒童無法取得之處。

