

口服抗流感病毒懸液劑 用藥指導單

- 本院備有口服抗流感病毒藥品學名為 Oseltamivir，商品名如下

英文商品名 中文商品名 臺安醫院藥品外觀辨識網站

Tamiflu 75mg 克流感膠囊



Eraflu 75mg 易剋冒膠囊



- 調配方法：下表舉例兩種劑量的調配方法

每次劑量	調配方法
0.27 Capsule (20 mg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將 3 顆膠囊粉末倒入小藥瓶中。 2. 將瓶中粉末搖鬆。 3. 邊加冷開水邊搖勻，最後加至 45 mL 刻度線。 4. 泡製完成後，請放入冰箱冷藏 (2-8°C)。 5. 每次使用 4 mL，一日兩次，早晚服用。 6. 每次服用前請徹底搖勻。
0.16 Capsule (12 mg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將 2 顆膠囊粉末倒入小藥瓶中。 2. 將瓶中粉末搖鬆。 3. 邊加冷開水邊搖勻，最後加至 30 mL 刻度線。 4. 泡製完成後，請放入冰箱冷藏 (2-8°C)。 5. 每次使用 2.4 mL，一日兩次，早晚服用。 6. 每次服用前請徹底搖勻。



將膠囊內藥粉倒入



倒入少許冷開水



振搖均勻



補冷開水至標線處



配製完成後請冷藏

- 注意事項

1. 請依醫師指示服用，配製後的懸液劑請在 5 日內用完
2. 抗病毒藥物治療有一定療程，請確實服完全程，勿自行停藥
3. 每顆膠囊劑量為 75 毫克，配製後懸液劑濃度為 5 毫克/毫升。

口服抗流感病毒懸液劑 用藥指導單

- 本院備有口服抗流感病毒藥品學名為 Oseltamivir，商品名如下

英文商品名 中文商品名 臺安醫院藥品外觀辨識網站

Tamiflu 75mg 克流感膠囊



Eraflu 75mg 易剋冒膠囊



- 調配方法：請依照下表方法調配

每次劑量	調配方法
<p>_____ Capsule (_____ mg)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將_____顆膠囊粉末倒入小藥瓶中。 2. 將瓶中粉末搖鬆。 3. 邊加冷開水邊搖勻，最後加至_____mL 刻度線。 4. 泡製完成後，請放入冰箱冷藏 (2-8°C)。 5. 每次使用_____mL，一日兩次，早晚服用。 6. 每次服用前請徹底搖勻。



將膠囊內藥粉倒入



倒入少許冷開水



振搖均勻



補冷開水至標線處



配製完成後請冷藏

- 注意事項

1. 請依醫師指示服用，配製後的懸液劑請在 5 日內用完
2. 抗病毒藥物治療有一定療程，請確實服完全程，勿自行停藥
3. 每顆膠囊劑量為 75 毫克，配製後懸液劑濃度為_____毫克/毫升。