



輝瑞 Paxlovid (COVID-19 口服藥) 用藥指導單

- ❑ 適應症：12 歲且 40 公斤以上兒童及成人新型冠狀病毒感染。
- ❑ 成份名及劑量：Nirmatrelvir 300mg+ Ritonavir 100mg
- ❑ 用法用量：一般劑量為一天兩次，每次需服用 2 顆粉紅色藥錠(Nirmatrelvir 150mg)及 1 顆白色藥錠 (Ritonavir 100mg)，5 天份療程。

	
<p>一盒內含五片藥片， 一片藥片為一天份藥量，共五天份藥量。</p>	<p>早晚各使用 3 顆藥錠，早上服用金色包裝，晚上服用藍色包裝，一次 2 顆粉紅色及 1 顆白色藥錠。</p>

❑ 注意事項：

- 可能會發生味覺異常、腹瀉、高血壓和肌肉痛的副作用，但不是每個人都會產生。如果您發現上述或其他異常反應，請諮詢您的醫療人員。如果反應輕微，不建議您自行停藥。
- 本藥與許多藥物有交互作用，若有服用其他藥物，請先諮詢您的醫療人員。
- 如果您有腎臟疾病病史，請諮詢您的醫師。



針對 eGFR: 30-60 mL/min 病患，

應降低劑量為 Nirmatrelvir 150mg+ Ritonavir 100mg，
即每次 1 顆粉紅色藥錠及 1 顆白色藥錠。

❑ 用藥指導：

- 可與食物併服，亦可不與食物併服。
 - 應整顆吞服錠劑，不要咀嚼、剝開或壓碎錠劑。如果有管灌需求請諮詢藥師如何使用。
 - 完成完整五天療程是很重要的。
- ❑ 如果忘了使用藥物，在原本的服藥時間 8 小時內想起，應儘快服藥並原本服藥時間繼續服藥。如果漏服時間超過 8 小時，則不應補用漏服的劑量，而應按照常規用藥時間服用下一劑藥物。也不應使用雙倍劑量。



臺安醫院
藥品外觀辨識網站



輝瑞 Paxlovid 中文說明書
(含病人與照顧者說明)