

默沙東 Molnupiravir (COVID-19 口服藥) 用藥指導單

1. 適應症：18 歲以上成人新型冠狀病毒感染。
2. 成份名及劑量：Molnupiravir 800mg
3. 用法用量：5 天份療程，一天兩次，每次需服用 4 顆膠囊 (每顆膠囊含 Molnupiravir 200mg)。
4. 注意事項：
 - 可能會發生腹瀉、噁心和暈眩的副作用，但不是每個人都會產生。如果您發現上述或其他異常反應，請諮詢您的醫療人員。如果反應輕微，不建議您自行停藥。
 - 本藥未被核准用於 18 歲以下的病人。
 - 本藥不建議用於懷孕婦女
5. 用藥指導：
 - 可與食物併服，亦可不與食物併服。
 - 應整顆吞服膠囊，不可打開、破壞或壓碎膠囊。如果病患必須將膠囊拆開，請諮詢藥師學習正確使用方式。
 - 完成完整五天療程是很重要的。
 - 如果忘了使用藥物，在原本的服藥時間 10 小時內想起，應儘快服藥並原本服藥時間繼續服藥。如果漏服時間超過 10 小時，則不應補用漏服的劑量，而應按照常規用藥時間服用下一劑藥物。也不應使用雙倍劑量。



臺安醫院
藥品外觀辨識網站



默沙東 Molnupiravir 中文說明書
(含病人與照顧者說明)