Last Updated 2023/06 最後更新:2023/06

建 臺安醫院

菲比藥膠布 用藥指導單

- 1. 清潔要貼片部位的皮膚並擦乾水漬。(請選擇無傷口的皮膚)
- 2. 依部位需求將貼片裁剪成適當大小。
- 3. 撕除貼片保護層。
- 4. 將貼片貼於皮膚,並用手掌用力緊壓 10 至 20 秒,以確保貼片與皮膚完全接觸。
- 5. 每次使用同一部位不宜超過8小時。
- 6. 手指勿接觸黏著層,使用完畢立即以清水洗手。
- 7. 使用過的貼片應丟棄,不宜重複使用。

Instruction of Flurbi PAP Patch

- 1. Apply to intact, non-hairy, dry skin. Avoid areas treated with radiotherapy, scar tissue or oedematous areas.
- 2. Cut the patch into appropriate size.
- 3. Remove the protective layer and apply the patch by firmly pressing with the palm of the hand for 10-20 seconds to ensure good contact.
- 4. Use the packaging sticker attached to fix the patch.
- 5. The same area should not be more than 8 hours.
- 6. Wash your hands when you finished applying a patch.
- 7. A patch can not be reused after discard.



臺安醫院藥品外觀辨識網站

TAH Drug Identity Search System