

## 歐必德穿皮貼片劑 用藥指導單

藥物名稱：歐必德穿皮貼片劑 12 微公克/小時 (Opiodur Patch 12mcg/h)

成分名：Fentanyl

作用：需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

注意事項：

- 首次使用貼片或突發的疼痛可能需要搭配口服或其他止痛藥物，請遵照醫師指示用藥，勿自行更改用量或時間。若有嗜睡或呼吸困難情況請立即通知醫療人員。
- 若有皮膚紅癢或噁心嘔吐的副作用，請告知醫療人員，可以輔助藥物持續本貼片治療。
- 本品貼片僅供經皮膚途徑使用。使用時請避免泡熱水澡或接觸熱源(如熱水袋或電熱毯)。
- 請確實填寫使用紀錄並於回診時繳回。使用過的貼片請對黏後放入原包裝紙袋，繳回醫院銷毀。如有未使用之貼片應退還回醫院。

### 貼上貼片的方法

1. 找尋合適的皮膚區塊：一塊無刺激的平整皮膚表面，最好是無毛髮生長的區域 (如後背、上手臂或大腿，不需要只貼在疼痛的部位)。如果需要請以剪除方式去除毛髮 (勿用刮的方式剔除)。請避開傷口或放射線治療的部位。
2. 清潔皮膚：用清水潔淨即可。不能使用肥皂、油、乳液或任何其它會刺激皮膚或改變膚質的物質。貼上貼片之前應使皮膚完全乾燥。
3. 取出藥片：將藥片從密封包裝內取出，請小心自保護小袋內取出，以剪刀在封緘的邊緣剪一個割痕，並沿著割痕小心地撕開小袋。使用前須檢查貼片的完整性，不要使用被剪過、分割或損壞的貼片。
4. 撕下透明保護片：撕下覆蓋貼片印刷面的透明保護膜，再從覆蓋貼片黏著層的透明保護膜上小心地剝下貼片的一角。撕開透明保護膜後需立即使用。
5. 貼上皮膚：剝下貼片時請避免接觸到貼片的黏著層。把貼片貼上皮膚，並用手掌輕壓 30 秒，確保整片貼片完全與皮膚接觸，尤其要注意角落部位應緊密黏貼。
6. 清水洗手。



### 更換貼片的注意事項

1. 一片貼片可連續貼足 72 小時。
2. 移除貼片後，新的貼片要貼在與前一片不同的位置。
3. 同一部位的皮膚必須相隔數日才可再貼上一片新的貼片。
4. 貼上貼片或移除貼片後只能用水洗手。

參考資料：衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠。仿單-108-07-30.pdf 衛生福利部食品藥物管理署 仿單資料。Retrieved 2022/12/15, <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D31.aspx?LicId=52027656>

