最後更新：2023/06

易週糖注射劑 用藥指導單

- 名稱：易週糖注射劑 1.5 毫克/0.5 毫升。
- 成份：Dulaglutide。
- 適應症：第二型糖尿病。
- 使用方法：皮下注射，每週使用一次，可在一天當中的任何時間，不須考慮進食與否。
- 保存方式：2 至 8°C 冷藏保存，不可冷凍。若保存於不超過 30°C 室溫下則不可超過 14 日。
- 忘記劑量：若錯過且距離下一次預定給藥時間大於 3 日(72 小時)，則應儘快使用。若距離下次預定給藥時間未滿 3 日，則應跳過錯過的劑量，於原本預定的日期給予下一次劑量。

開始注射前

1.將藥物自冰箱取出，請保持基座蓋蓋著。
2.核對藥物正確並確認效期。
3.檢查注射筆外觀完整並確認藥物無混濁或異物。
4.清洗雙手。

選擇注射部位

可將藥物注射於**腹部**或**大腿**
由他人協助時可注射於**上臂**



藥品構造



注射步驟

1. 確認注射筆上鎖，垂直向下取下基座蓋，請勿再將基座蓋蓋回。
2. 將藥物透明基座平放在注射部位，並緊壓皮膚。旋轉上鎖環來解鎖。

①



②



3. 按住綠色注射鈕；會先聽見一次響亮喀聲，持續將藥物透明基座**緊貼皮膚直到第二次聽見喀聲**，可目視藥物透明視窗，看到灰色活塞表示已完成注射，注射完成後可將注射筆從皮膚移開。

③



臺安醫院藥品外觀辨識網站

資料來源:
1.衛生福利部食品藥物管理署. *衛部菌疫輸字第 000978 號*. 許可證詳細內容. Retrieved July 19, 2022, from https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=60000978
2.台灣禮來股份有限公司. (2020, May 25). *Trulicity-用藥指引-109-05-25*. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978
3.台灣禮來股份有限公司. (2020, May 25). *Trulicity-仿單 revised-109-05-25*. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978
4.台灣禮來股份有限公司. (2019, June 28). *TRULICITY 1.5mg-使用手冊 201905-108-06-28*. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978