

藥物食物交互作用衛教單(五) – 其它用藥

藥品分類/本院商品名	有交互作用的食物	影響與建議
皮膚科口服 A 酸： Neotigason	酒精	酒精使延長本類藥品的致畸胎毒性。育齡婦女在服藥期間及停藥後兩個月內，避免飲酒或使用含酒精的飲品、藥物。
	維生素 A 補充劑	本類藥品增強維生素 A 的副作用或毒性。服藥期間避免超量攝取維生素 A (勿超過每日建議量)，注意是否出現維生素 A 過量症狀：噁心、頭痛、暈眩、視力模糊等。
茶鹼類氣管擴張劑： Xanthium, Phyllocontin, Centertheo	含咖啡因食物：咖啡、茶、可樂、巧克力	本類藥品與咖啡因作用相似，過量使用可引起噁心、肌肉顫抖、失眠、心律不整等副作用。服藥期間應避免食用含咖啡因的飲料或食物。
抗生素： Metrozole, Metronidazole	酒精	藥物與酒精作用，可能引起：潮紅、頭痛、噁心、呼吸急促、低血壓等不良反應。服藥期間避免飲酒或含酒精食品。
四環黴素： Doxymycin, Tetracycline	高鈣食物：牛奶、乳製品、吻仔魚、黑芝麻、豆干、小魚乾、海帶	飲食中的鈣離子會影響藥物的吸收與藥效。建議分開服用。
喹諾酮類抗生素： Avelox, Cinolone, Cravit, Dolcol	高鈣食物：牛奶、乳製品、吻仔魚、黑芝麻、豆干、小魚乾、海帶	飲食中的鈣離子會影響藥物的吸收與藥效。建議分開服用。
	含咖啡因食物：咖啡、茶、可樂、巧克力	本類藥品抑制咖啡因代謝，造成噁心、肌肉顫抖、失眠、心律不整等副作用。服藥期間應避免食用含咖啡因的飲料或食物。
抗生素： Zyvox	高酪胺酸(tyramine)食品：培根、香腸、火腿、熱狗、臘肉、鴨賞、肉或魚乾、肉或魚鬆、魷魚絲、小魚乾、烏魚子、干貝、蝦米、蝦皮、乳酪	本類藥物與食品中酪胺酸可能引發稱為「乳酪反應」的高血壓危象。服藥期間避免食用含大量酪胺酸的食物，並注意：嚴重頭痛、血壓上升、心悸、出汗等異常症狀。

*以上衛教資訊未包含所有藥物食物交互作用，若您正在服用其他保健食品、中草藥，或有相關用藥問題，請諮詢醫療專業人員。